

# Estado das Culturas e Previsão das Colheitas – março 2025

Publicado em: 28 de Abril, 2025

A área cultivada de batata do cedo, no mês de março, foi ligeiramente inferior à do ano passado, em algumas ilhas; tal deveu-se, sobretudo, ao estado do tempo

O mês de março foi mais frio que o habitual para a época e verificou-se a ocorrência frequente de ventos fortes. A precipitação situou-se dentro dos parâmetros considerados normais.

Quadro 1 – Temperatura e Precipitação do mês de referência

Ilha	Temperatura Mensal		
	Média (°C)	Máx. (°C) / Dia	Min. (°C) / Dia
Santa Maria	14,4	19,2 / 11	7,4 / 13
São Miguel	14,3	19,9 / 04 e 10	7,9 / 18
Terceira	13,5	19,4 / 04	8,2 / 12
Graciosa	14,1	19,8 / 24	7,2 / 22
São Jorge	13,3	19,3 / 24	8,2 / 22
Pico	14,0	20,3 / 29	8,1 / 03 e 22
Faial	14,2	21,8 / 30	8,1 / 13
Flores	14,2	20,5 / 24	8,7 / 14
Corvo	14,6	19,7 / 28	8,3 / 31

**Fonte:** Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Figura 1 – Temperatura média do ar no mês de referência (°C)





Figura 2 – Quantidade de Precipitação total no mês de referência (mm)



O valor da temperatura média do ar variou entre 13,3 °C na ilha de São Jorge e 14,6 °C na ilha do Corvo; a temperatura mínima mais baixa foi 7,2 °C, na ilha Graciosa, e a máxima mais elevada foi 21,8 °C, na ilha do Faial.

Quanto à precipitação, o valor mais elevado dos totais mensais foi registado na ilha das Flores (184,4 mm) e o valor mais baixo na ilha Graciosa (95,0 mm). O estado do tempo verificado durante o mês de março exerceu uma influência negativa no desenvolvimento das pastagens, principalmente as situadas a maior altitude. Adicionalmente, o estado do tempo foi pouco favorável à efetuação da plantação de batata do cedo. As restantes culturas, poucas nesta época do ano, não foram muito afetadas.

As pastagens situadas em zonas altas e médias apresentaram um aspeto vegetativo pouco satisfatório, tendo sido penalizadas pelas condições climáticas adversas ocorridas nos últimos meses. Denotaram-se danos causados pelo vento, bem como pisoteio em consequência do encharcamento. As temperaturas baixas não permitiram um bom crescimento da erva. As pastagens situadas a menor altitude não foram tão afetadas pelo estado do tempo, proporcionando melhor produção e evidenciando menos estragos.

Prevê-se, numa primeira estimativa, que a área cultivada com batata do cedo seja ligeiramente inferior à do ano anterior nas ilhas Terceira, Graciosa, São Jorge e Pico. Tal deveu-se, essencialmente, ao estado do tempo, mas também a alguma desmotivação dos produtores devido à falta de mão de obra. Nas restantes ilhas espera-se que a área permaneça sensivelmente idêntica à cultivada no ano anterior.

#### Quadro 2 – Áreas de Sementeira ou Plantação

Ilha	Batata do cedo ' 1
	Índice 100 - Área homóloga do ano anterior
Santa Maria	100
São Miguel	100
Terceira	90
Graciosa	95
São Jorge	97
Pico	90
Faial	100
Flores	100
Corvo	100

A cultura do inhame, não sendo uma cultura particularmente sensível às condições climáticas, proporcionou, até à data, uma produção dentro dos parâmetros considerados normais na maioria das ilhas. Contudo, na ilha das Flores a produção afigura-se ligeiramente inferior, enquanto nas ilhas de Santa Maria e Terceira, numa primeira estimativa, situar-se-á apenas em 85% do normal. Questões relacionadas com o maneio, nomeadamente o cultivo em solos pouco adequados, poderão estar relacionados com a diminuição de produção.

Quanto à cultura da batata-doce, a produção foi semelhante à do ano passado, tanto em quantidade como em qualidade. Apenas nas ilhas de Santa Maria e Terceira ficou ligeiramente aquém do habitual, embora, no caso da ilha de Santa Maria, um pouco superior ao que se previa na estimativa do mês anterior. Pelo contrário, na ilha Terceira, inicialmente esperava-se que a produção se situasse dentro do considerado normal, contudo, numa segunda estimativa, aponta-se para uma produção ligeiramente inferior.

#### Quadro 3 – Colheitas no mês de referência

Ilha	Inhame '		Batata-doce ''	
	Índice 100 - Produção considerada normal	Índice 100 - Produção global do ano anterior	Índice 100 - Produção considerada normal	Índice 100 - Produção global do ano anterior
Santa Maria	85	95	95	100
São Miguel	100	100	100	100
Terceira	85	95	95	100
Graciosa	100	100	100	100
São Jorge	100	100	100	100
Pico	100	100	100	100
Faial	100	100	100	100
Flores	95	105	100	100
Corvo	-	-	-	-

## Nota metodológica

### Introdução

O Estado das Culturas e Previsão das Colheitas (ECPC) é um projeto mensal que disponibiliza informação de carácter previsional, relativamente a áreas, rendimentos e produções das principais culturas dos Açores.

A abrangência da operação estatística, no âmbito da produção vegetal é relativamente vasta, permitindo o acompanhamento das principais culturas.

### Recolha

A recolha da informação junto das explorações agrícolas é feita de forma sistematizada garantindo a cobertura espacial e heterogeneidade cultural adequada, e promovendo contatos regulares com os agricultores representativos da realidade agrícola da área de atuação. As hortas familiares não são consideradas.

As fontes de informação, constituem mais um dos vetores sobre os quais assenta a recolha, exigindo um esforço contínuo no sentido de avaliar a representatividade e credibilidade das fontes contactadas e garantir que este inventário acompanhe a evolução dos agentes económicos acreditados regionalmente. Estas fontes incluem: peritos regionais, cooperativas agrícolas, associações de agricultores, empresas do ramo agroindustrial, organismos de intervenção agrícola e de coordenação e estruturas de mercado (empresas de serviços e assistência técnica, nomeadamente as relativas à venda de fatores de produção).

A recolha assenta ainda na observação direta da paisagem.

### Tratamento de Informação Quantitativa

Ilha	Inhame '		Batata-doce ''	
	Índice 100 - Produção considerada normal	Índice 100 - Produção global do ano anterior	Índice 100 - Produção considerada normal	Índice 100 - Produção global do ano anterior
Santa Maria	85	95	95	105
São Miguel	100	100	100	100
Terceira	85	95	95	105
Graciosa	100	100	100	100
São Jorge	100	100	100	100
Pico	100	100	100	100
Faial	100	100	100	100
Flores	95	105	100	100
Corvo	-	-	-	-